


Résultat du sondage de l'OPIQ, mené auprès d'inhalothérapeutes cliniciens, quant aux habitudes d'intervention (minimale ou brève) en saines habitudes de vie.

Au sujet l'outil clinique «L'inhalothérapeute intervient auprès de ses patients fumeurs»
(OPIQ–INSPQ, 2007)

38 % des répondants disent **ne pas savoir** que l'OPIQ avait publié cet outil.

25 % des répondants qui connaissent cet outil disent l'**utiliser** «toujours» ou «souvent» **dans leur pratique.**



Information

- L'outil clinique est offert gratuitement. Il est accessible en ligne à partir du site Web de l'OPIQ.

À propos du sondage

1. En juin 2016, l'OPIQ a conduit un sondage auprès de 1000 inhalothérapeutes cliniciens exerçant dans un établissement de santé (urgence, soins intensifs, anesthésie, pneumologie, etc.), dans une clinique médicale (p. ex. GMF) ou offrant des soins et services à domicile (public ou privé) auprès de clientèles multiples (néonatalogie, pédiatrie, adulte et gériatrie).
2. Par ce sondage, l'OPIQ souhaitait en savoir davantage sur les habitudes d'intervention (minimale ou brève) en saines habitudes de vie (abandon du tabac, hygiène du sommeil, activité physique et saine alimentation) faites auprès de personnes vivant avec une maladie cardiorespiratoire (ou leurs proches).
3. Taux de réponse : 21 %
4. Suivez ce lien pour consulter [tous les résultats](#).