


Résultat du sondage de l'OPIQ, mené auprès d'inhalothérapeutes cliniciens, quant aux habitudes d'intervention (minimale ou brève) en saines habitudes de vie.

Au sujet de l'abandon du tabagisme



85 % des répondants sont «plutôt en accord» ou «entièrement en accord» pour dire que c'est leur rôle de faire des interventions en abandon du tabac auprès des patients fumeurs (ou leurs proches).

- Plutôt en accord : 25 %
- Entièrement en accord : 60 %

65 % des répondants disent qu'ils discutent «souvent» ou «toujours» des bienfaits de l'abandon du tabac avec leurs patients*.

- Souvent : 35 %
- Toujours : 30 %

*Au cours des 3 derniers mois travaillés.

56 % des répondants sont «plutôt en accord» ou «entièrement en accord» pour dire qu'ils sont en mesure d'intervenir efficacement auprès des patients (ou leurs proches) pour les aider à cesser de fumer.

- Plutôt en accord : 29 %
- Entièrement en accord : 27 %

À propos du sondage

1. En juin 2016, l'OPIQ a conduit un sondage auprès de 1000 inhalothérapeutes cliniciens exerçant dans un établissement de santé (urgence, soins intensifs, anesthésie, pneumologie, etc.), dans une clinique médicale (p. ex. GMF) ou offrant des soins et services à domicile (public ou privé) auprès de clientèles multiples (néonatalogie, pédiatrie, adulte et gériatrie).
2. Par ce sondage, l'OPIQ souhaitait en savoir davantage sur les habitudes d'intervention (minimale ou brève) en saines habitudes de vie (abandon du tabac, hygiène du sommeil, activité physique et saine alimentation) faites auprès de personnes vivant avec une maladie cardiorespiratoire (ou leurs proches).
3. Taux de réponse : 21 %
4. Suivez ce lien pour consulter [tous les résultats](#).